



# DIETA PAPKOWATA

## Zastosowanie:

*Dla osób:*

- 1) z chorobami jamy ustnej, przełyku (zapalenia przełyku, rak przełyku, zwężenia przełyku, żylaki przełyku);*
- 2) z utrudnionym gryzieniem i połykaniem;*

## Zalecenia dietetyczne:

- 1) dieta papkowata jest modyfikacją diet łatwostrawnych w ich specjalistycznych formach, modyfikacja polega na zmianie konsystencji produktów i potraw, które podawane są w formie papkowatej. Zmiany konsystencji może wymagać zarówno dieta np. bogatobiałkowa czy o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych;*
- 2) wartość energetyczna i odżywcza diety dostosowywana jest do masy ciała i stanu fizjologicznego pacjenta, w oparciu o aktualne normy żywienia dla populacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytyczne towarzystw naukowych w zakresie żywienia;*
- 3) dieta powinna być prawidłowo zbilansowana i urozmaicona pod kątem udziału grup produktów spożywczych: produktów zbożowych, mlecznych, warzyw i owoców, ziemniaków, produktów mięsnych i ryb, tłuszczów;*
- 4) dieta papkowata powinna opierać się na spożyciu produktów i potraw świeżych, o zmniejszonej ilości nierozpuszczalnej w wodzie frakcji błonnika pokarmowego, z wykluczeniem potraw wzdymających i ciężkostrawnych;*
- 5) produkty i potrawy należy podawać w formie papkowatej, która nie wymaga gryzienia;*



- 6) wyklucza się produkty czy potrawy, które mogłyby drażnić zmieniony chorobowo przełyk lub jamę ustną (kwaśne, pikantne, słone);
- 7) temperatura posiłków powinna być równa temperaturze pokojowej 20–25°C, albo zbliżona do temperatury ciała ok. 37°C;
- 8) posiłki powinny być podawane 4–5 razy dziennie zgodnie z zaleceniami lekarza lub dietetyka, w regularnych odstępach czasu, nieobfite;
- 9) dieta powinna być różnorodna, urozmaicona pod względem smaku i kolorystyki;
- 10) w każdym posiłku należy uwzględnić wodę lub napój – w przypadku kompotu zawartość cukrów nie może być większa niż 5 g cukrów w 250 ml kompotu, pozostałe napoje (np. kawa, herbata) powinny być przygotowywane bez cukru;
- 11) dodatek dozwolonych warzyw lub owoców do każdego posiłku (minimum 400 g dziennie – do gramatury nie są wliczane ziemniaki i bataty), z przewagą warzyw gotowanych;
- 12) mleko i przetwory mleczne, w tym napoje fermentowane lub produkty roślinne zastępujące produkty mleczne powinny być spożywane co najmniej w 2 posiłkach w ciągu dnia;
- 13) każdego dnia należy podawać co najmniej 1 porcję z grupy mięso lub jaja lub dozwolone produkty z nasion roślin strączkowych, inne roślinne zamienniki białka zwierzęcego;
- 14) ryby lub przetwory rybne (głównie z ryb morskich) należy uwzględnić co najmniej 3 razy w jadłospisie dekadowym;
- 15) tłuszcze zwierzęce (takie jak smalec, słonina, łój wołowy, smalec gęsi) należy całkowicie wyeliminować z diety. Nie należy używać ich ani do przygotowywania potraw na ciepło, ani na zimno. Jedynym tłuszczem zwierzęcym, który zaleca się stosować w niewielkich ilościach, w postaci na surowej, na zimno jest masło. Podstawowym źródłem tłuszczu w jadłospisie powinny być tłuszcze roślinne – np. olej rzepakowy, lniany, oliwa z oliwek czy miękkie margaryny. Wyjątek stanowią olej kokosowy i olej palmowy, które nie są zalecane i również należy je wykluczyć;



- 16) przynajmniej 1 posiłek w ciągu dnia powinien zawierać produkty bogate w kwasy tłuszczowe nienasycone;
- 17) należy eliminować cukry dodane (tj. monocukry i dwucukry dodawane do żywności);
- 18) wskazane jest ograniczenie potraw ciężkostrawnych i wzdymających;
- 19) w przypadku braku możliwości spożywania pokarmów drogą doustną (m.in. nasilone objawy w chorobach jamy ustnej i przełyku: ból, zwężenie przełyku, rany; dysfagia neurogenna) konieczne jest zastosowanie żywienia dojelitowego przez sztuczny dostęp z zastosowaniem diet przemysłowych/ (FSMP).

Przy doborze produktów należy zwrócić uwagę na ich:

- jakość;
- termin przydatności do spożycia;
- sezonowość.

*Stosowane techniki kulinarne:*

- *gotowanie tradycyjne lub na parze;*
- *duszenie bez wcześniejszego obsmażania;*
- *pieczenie bez dodatku tłuszczu, np. w folii aluminiowej, w rękawach do pieczenia, pergaminie, naczyniach żaroodpornych oraz w piecach konwekcyjnych.*



## Praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania posiłków:

- zupy, sosy oraz potrawy należy sporządzać z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;
- ugotowane danie powinno być ostudzone, następnie zmiksowane, doprowadzone do odpowiedniej papkowatej konsystencji i podane pacjentowi;
- w przypadku dania zbyt gęstego należy dodać przegotowaną wodę;
- do zagęszczania potraw zaleca się stosowanie zawiesiny z mąki, kaszy manny, płatków ryżowych lub ryżu oraz mleka lub wody; natomiast u osób z zaburzeniami połykania (dysfagia) odpowiednią modyfikację konsystencji za pomocą zagęstników odpornych na działanie amylazy (żywność specjalnego przeznaczenia medycznego).
- w diecie papkowej szczególne zastosowanie mają zupy przecierane, zupy kremy, owoce w postaci przecierów lub soków, warzywa gotowane, duszone i rozdrobnione;
- pieczywo przed zmiksowaniem powinno zostać namoczone w wodzie, mleku lub zupie;
- sery, jaja, mięsa, warzywa, ziemniaki podawać zmiksowane z mlekiem, wodą lub z zupą;
- zasadne może być stosowanie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego; U osób u których spełnienie zapotrzebowania za pomocą zwykłej żywności nie jest możliwe, zasadne jest jako uzupełnienie zastosować doustną żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, pomiędzy posiłkami lub jako dodatek do posiłku. U osób u których spełnienie zapotrzebowania drogą doustną nie jest możliwe, należy zastosować żywienie dojelitowe przez sztuczny dostęp z zastosowaniem diet przemysłowych (FSMP);
- wykluczyć zabielenie zup i sosów śmietaną i jej roślinnymi zamiennikami np. mleczkiem kokosowym;
- wykluczyć dodatek zasmażek do potraw;
- do minimum ograniczyć cukier dodawany do napojów i potraw;
- ograniczyć lub wykluczyć dodatek soli na rzecz naturalnych ziół i przypraw.



Energia(En)/dobę	1800-2400 kcal/dobę
Białko	15-20% En lub 37,5-50g/1000kcal
Tłuszcz ogółem	20-30% En lub 22-33g/1000kcal
W tym nasycone kwasy tłuszczowe	Jak najmniej, nie więcej niż 10% En lub $\leq 11\text{g}/1000\text{kcal}$
Węglowodany ogółem	45-65% En lub 113-163 g/1000kcal
W tym cukry(mono- i disacharydy)	$\leq 10\%$ En lub $\leq 25\text{g}/1000\text{kcal}$
Błonnik	$\geq 25\text{g}/\text{d}$
Sód	$\leq 2000\text{mg}/\text{d}$

## **Produkty zalecane i przeciwwskazane**

<b>Grupy środków spożywczych</b>	<b>Produkty rekomendowane</b>	<b>Produkty przeciwwskazane</b>
Produkty zbożowe	<ol style="list-style-type: none"><li>1) wszystkie mąki średniego i niskiego przemiału;</li><li>2) mąka pszenna, żytnia, ziemniaczana, kukurydziana, ryżowa;</li><li>3) namoczone białe pieczywo pszenne, żytnie i mieszane;</li><li>4) kasze średnio i drobnoziarniste, np.: manna, kukurydziana, jęczmienna (mazurska, wiejska), orkiszowa, jagłana, krakowska;</li><li>5) płatki naturalne błyskawiczne np.: owsiane, gryczane, jęczmienne, żytnie, ryżowe;</li><li>6) makarony drobne;</li><li>7) ryż biały;</li><li>8) namoczone suchary.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) wszystkie mąki pełnoziarniste;</li><li>2) pieczywo z dodatkiem cukru, słoju, syropów, miodu, karmelu;</li><li>3) pieczywo pełnoziarniste;</li><li>4) pieczywo cukiernicze i półcukiernicze;</li><li>5) produkty mączne smażone w dużej ilości tłuszczu, np.: pączki, faworki, racuchy, kasze gruboziarniste, np.: gryczana, pęczak;</li><li>6) płatki kukurydziane i inne słodzone płatki śniadaniowe, np.: cynamonowe, czekoladowe, miodowe;</li><li>7) makarony grube i pełnoziarniste;</li><li>8) ryż brązowy, ryż czerwony;</li></ol>



		9) otręby, np.: owsiane, pszenne, żytnie, orkiszowe.
Warzywa i przetwory warzywne	1) rozdrobnione warzywa, mrożone, gotowane, duszone z niewielkim dodatkiem tłuszczu, pieczone (z wykluczeniem przeciwwskazanych);	1) warzywa nierozdrobnione, w postaci wymagającej gryzienia; 2) warzywa kapustne: kapusta, brukselka, kalafior, brokuł, rzodkiewka, rzepa; 3) warzywa cebulowe podawane na surowo oraz smażone: cebula, por, czosnek, szczypior; 4) ogórki, papryka, kukurydza; 5) warzywa przetworzone tj. warzywa konserwowe, warzywa smażone lub przyrządzane z dużą ilością tłuszczu; 6) kiszona kapusta; 7) grzyby; 8) surówki z dodatkiem śmietany.
Ziemniaki, Bataty	1) ziemniaki, bataty: gotowane, zmiksowane.	1) ziemniaki, bataty: smażone (frytki, talarki); 2) puree w proszku.
Owoce i przetwory owocowe	1) owoce dojrzałe, rozdrobnione (bez skórki i pestek); 2) przeciery i musy owocowe z niską zawartością lub bez dodatku cukru; 3) owoce drobnopestkowe, np.: porzeczka, agrest, maliny, jagoda, truskawki (wyłącznie pozbawione pestek, przetarte przez sito).	1) owoce nierozdrobnione, wymagające gryzienia; 2) owoce niedojrzałe; 3) owoce ciężkostrawne (czereśnie, gruszki, śliwki); 4) owoce w syropach cukrowych; 5) owoce kandyzowane; 6) przetwory owocowe wysokosłodzone; 7) owoce suszone.
Nasiona roślin strączkowych	1) produkty z nasion roślin strączkowych: niesłodzone napoje roślinne, tofu naturalne rozdrobnione, jeżeli dobrze tolerowane.	1) pozostałe nasiona roślin strączkowych.
Nasiona, pestki, orzechy	1) mielone nasiona, np. siemię lniane, słonecznik, dynia (w ograniczonych ilościach).	1) całe nasiona, pestki, orzechy; 2) „masło orzechowe”; 3) wiórki kokosowe.
Mięso i przetwory	1) rozdrobnione (zmiksowane), z małą	1) z dużą zawartością tłuszczu, np.:



mięsne	<p>zawartością tłuszczu, np.: drób bez skóry (kura, kurczak, indyk), chuda wołowina, cielęcina, jagnięcina, królik, chude partie wieprzowiny, np.: polędwica, schab, szynka;</p> <p>2) rozdrobnione (zmiksowane) chude gatunki wędlin niemielonych: drobiowych, wieprzowych, wołowych;</p> <p>3) rozdrobnione (zmiksowane) chude gatunki kielbas.</p>	<p>tłusty drób (kaczka, gęś), tłusta wołowina i wieprzowina, baranina;</p> <p>2) mięsa peklowane oraz z dużą zawartością soli;</p> <p>3) mięsa smażone na dużej ilości tłuszczu, w panierce;</p> <p>4) tłuste wędliny, np.: baleron, boczek;</p> <p>5) tłuste i niskogatunkowe kielbasy, parówki, mielonki, mortadele;</p> <p>6) pasztety;</p> <p>7) wędliny podrobowe (pasztetowa, wątrobianka, salceson);</p> <p>8) mięsa surowe np. tatar.</p>
Ryby i przetwory rybne	<p>1) wszystkie ryby morskie i słodkowodne rozdrobnione (zmiksowane).</p>	<p>1) ryby surowe;</p> <p>2) ryby smażone na dużej ilości tłuszczu, w panierce;</p> <p>3) ryby wędzone;</p> <p>4) konserwy rybne w oleju.</p>
Jaja i potrawy z jaj	<p>1) gotowane na miękko rozdrobnione.</p>	<p>1) gotowane na twardo;</p> <p>2) jaja przyrządzane z dużą ilością tłuszczu;</p> <p>3) jajecznica, jaja sadzone, omlety, kotlety jajeczne smażone tłuszczu.</p>
Mleko i produkty mleczne	<p>1) mleko i sery twarogowe chude lub półtłuste;</p> <p>2) niskotłuszczowe naturalne napoje mleczne fermentowane, bez dodatku cukru (np. kefir, jogurt, maślanka).</p>	<p>1) mleko i sery twarogowe tłuste;</p> <p>2) mleko skondensowane; 3) jogurty, napoje i desery mleczne z dodatkiem cukru; 4) wysokotłuszczowe napoje mleczne fermentowane; 5) sery podpuszczkowe; 6) śmietana.</p>
Tłuszcze	<p>1) masło (w ograniczonych ilościach);</p> <p>2) miękka margaryna;</p> <p>3) oleje roślinne, np.: rzepakowy, oliwa z oliwek.</p>	<p><b>BEZWZGLĘDNIIE ZAKAZANE:</b></p> <p>1) tłuszcze zwierzęce, np.: smalec, słonina, łój;</p> <p>2) twarde margaryny;</p> <p>3) masło klarowane;</p> <p>4) majonez;</p>



		<ul style="list-style-type: none"><li>5) tłuszcz kokosowy i palmowy;</li><li>6) „masło kokosowe”;</li><li>7) frytura smaźalnicza.</li></ul>
Desery (w ograniczonych ilościach)	<ul style="list-style-type: none"><li>1) budyń (bez dodatku cukru lub z małą ilością cukru – do 5 g/250 ml użytego mleka);</li><li>2) kisiel (bez dodatku cukru lub z małą ilością cukru – do 5 g/250 ml użytej wody);</li><li>3) namoczone ciasta drożdżowe, niskosłodzone;</li><li>4) namoczone ciasta biszkoptowe, niskosłodzone (bez dodatku proszku do pieczenia).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6) słodycze zawierające duże ilości cukru lub tłuszczu;</li><li>7) torty i ciasta z masami cukierniczymi, kremami cukierniczymi, bitą śmietaną;</li><li>8) ciasta kruche z dużą ilością tłuszczu;</li><li>9) ciasto francuskie;</li><li>10) wyroby czekoladopodobne.</li></ul>
Napoje	<ul style="list-style-type: none"><li>1) woda niegazowana;</li><li>2) słabe napary herbat, np.: czarna, zielona, czerwona, biała;</li><li>3) napary owocowe;</li><li>4) kawa zbożowa (w ograniczonych ilościach);</li><li>5) bawarka;</li><li>6) kakao naturalne;</li><li>7) soki warzywne;</li><li>8) soki owocowe (w ograniczonych ilościach);</li><li>9) kompoty (bez dodatku cukru lub z małą ilością cukru – do 5 g/250 ml).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) woda gazowana;</li><li>2) napoje gazowane;</li><li>3) napoje wysokosłodzone;</li><li>4) nektary owocowe;</li><li>5) wody smakowe z dodatkiem cukru;</li><li>6) mocne napary kawy i herbaty.</li></ul>
Przyprawy	<ul style="list-style-type: none"><li>1) łagodne naturalne przyprawy ziołowe i korzenne np.: liść laurowy, ziele angielskie, koper zielony, kminek, tymianek, majeranek, bazyliia, oregano, tymianek, lubczyk, rozmaryn, pieprz ziołowy, goździki, cynamon;</li><li>2) sól i cukier (w ograniczonych ilościach).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) ostre przyprawy np.: czarny pieprz, pieprz cayenne, ostra papryka, papryka chili;</li><li>2) kostki rosółowe i esencje bulionowe;</li><li>3) gotowe bazy do zup i sosów;</li><li>4) gotowe sosy sałatkowe i dressingi;</li><li>5) musztarda, keczup, ocet;</li><li>6) sos sojowy, przyprawy wzmacniające smak w postaci płynnej i stałej.</li></ul>